

Рекомендуемые режимы терапии с использованием Ванкомабола®

Нозология	Режим	Продолжительность терапии
Бактериальный менингит	Взрослые: ВАНКОМАБОЛ – 500-750 мг в/в каждые 6 часов Дети: ВАНКОМАБОЛ – 15 мг/кг в/в каждые 6 часов	Зависит от возбудителя, в среднем 7-14 дней
Пневмония, вызванная MRSA	Взрослые: ВАНКОМАБОЛ – 500 мг в/в каждые 6 часов, или по 1 г в/в каждые 12 ч Дети: ВАНКОМАБОЛ – 10 мг/кг в/в каждые 6 часов	14-21 день
Бактериальный эндокардит	Взрослые: ВАНКОМАБОЛ – 500 мг в/в каждые 6 часов, или по 1 г в/в каждые 12 ч +/- гентамицин 3 мг/кг/сутки в/в или в/м в 2-3 введения Дети: ВАНКОМАБОЛ – 10 мг/кг в/в каждые 6 часов +/- гентамицин 3 мг/кг/сутки в/в или в/м в 2-3 введения	4-6 нед. (2 нед. – для гентамицина)
Инфекции мягких тканей, вызванные MR <i>Staphylococcus</i> spp.	Взрослые: ВАНКОМАБОЛ – 500 мг в/в каждые 6 часов, или по 1 г в/в каждые 12 ч Дети: ВАНКОМАБОЛ – 10 мг/кг в/в каждые 6 часов	10-14 дней
Стафилококковые инфекции у пациентов с аллергией на бета-лактамы	Взрослые: ВАНКОМАБОЛ – 500 мг в/в каждые 6 часов, или по 1 г в/в каждые 12 ч Дети: ВАНКОМАБОЛ – 10 мг/кг в/в каждые 6 часов	Зависит от локализации, в среднем 7-14 дней
Сепсис, вызванный грамположительными аэробными кокками и грамположительными бактериями	Взрослые: ВАНКОМАБОЛ – 500 мг в/в каждые 6 часов, или по 1 г в/в каждые 12 ч Дети: ВАНКОМАБОЛ – 10 мг/кг в/в каждые 6 часов	14-21 день
Инфекции костей и суставов, вызванный грамположительными аэробными кокками и грамположительными бактериями	Взрослые: ВАНКОМАБОЛ – 500 мг в/в каждые 6 часов, или по 1 г в/в каждые 12 ч Дети: ВАНКОМАБОЛ – 10 мг/кг в/в каждые 6 часов	Длительная. После купирования острых явлений возможен переход на прием пероральных антибиотиков с антистафилококковой активностью
Инфекции глаз: кератит (в т.ч. у больных сахарным диабетом)	Глазные капли: раствор ВАНКОМАБОЛА 50 мг/мл - по 1 капле каждый час в течение 24-72 ч., затем постепенно увеличивают интервалы между инстилляциями + раствор Вицефа 50 мг/мл - по 1 капле каждый час в течение 24-72 ч., затем постепенно увеличивают интервалы между инстилляциями (<i>или</i> раствор гентамицина 14 мг/мл в том же режиме)	7-14 дней
Инфекции глаз: бактериальный эндофтальмит	Интравитреально: ВАНКОМАБОЛ 1 мг в 0,1 мл растворителя – 1 или 2 инъекции с интервалом в 2-3 дня + Вицеф 2,25 мг в 0,1 мл растворителя 1 или 2 инъекции с интервалом в 2-3 дня (каждый препарат разводят и вводят в отдельном шприце)	
Периоперационная антибиотикопрофилактика (в том числе у больных с аллергией на бета-лактамы)	Взрослые: ВАНКОМАБОЛ – 1000 мг в/в за 60-90 мин до операции; Дети: ВАНКОМАБОЛ – 10-15 мг/кг в/в за 60-90 мин до операции	