ABOLMED
ПРОИЗВОДСТВО ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Таблица чувствительности основных бактериальных возбудителей к антибиотикам производства ООО «АБОЛмед»

(in vitro)

Препарат \ Микроорганизмы		Грам (+) аэробы									Грам (-) аэробы																					Анаэробы					Прочие			
		Streptococcus spp.	*S. pneumoniae*	*S. viridans*	*E. faecalis*	*E. faecium*	*S. aureus MS*	*S. aureus MR*	*S. epidermidis*	*L. monocytogenes*	*N. meningitidis*	*N. gonorrhoeae*	*M. catarrhalis*	*H. influenzae*	*E. coli*	*P. vulgaris*	*P. mirabilis*	*Providencia spp.*	*Morganella spp.*	*B.cepacia*	*S. maltophilia*	*Y. enterocolitica*	*P. multocida*	*Shigella spp.*	*Salmonella spp.*	*Klebsiella spp.*	*Enterobacter spp.*	*Serratia spp.*	*Citrobacter spp.*	*Acinetobacter spp.*	*P. aeruginosa*	*Legionella spp.*	*B. fragilis*	*Peptostreptococcus spp.*	*Clostridium spp.*	*C. difficile*	*Prevotella melaninogenica*	*Chlamydia spp.*	*Mycoplasma spp.*	*B. burgdorferi*	*Treponema pallidum*
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Цефалоспорины (поколения)	I НАЦЕФ® (цефазолин)											*	*	*											*	*															
	II ЦЕФАМАБОЛ® (цефамандол)																																								
	ЦЕФУРАБОЛ® (цефуроксим)																										*	*													
	АНАЭРОЦЕФ® (цефокситин)																												*												
	III ЦЕФАБОЛ® (цефотаксим)																																								
	ЦЕФТРИАБОЛ® (цефтриаксон)																																								
	ЦЕФОПЕРАБОЛ® (цефоперазон)																																								
	ВИЦЕФ® (цефтазидим)																																								
	СУЛЬПЕРАЦЕФ® (цефоперазон/сульбактам)																																								
	IV МАКСИЦЕФ® (цефепим)																																								
Антибиотики других групп	ЛИКЛАВ® (амоксициллин/клавуланат)																																								
	МЕРОПЕНАБОЛ® (меропенем)																																								
	УРОФОСФАБОЛ® (фосфомицин)		*	*																																					

– возбудитель чувствителен к препарату (при МПК$_{90}$ чувствительны более 60% штаммов)

– возбудитель умеренно чувствителен к препарату (при МПК$_{90}$ чувствительны от 30 до 60% штаммов)

– возбудитель нечувствителен к препарату (при МПК$_{90}$ чувствительны менее 30% штаммов)

– нет определенных (достоверных) клинико-микробиологических данных об активности

* – клиническое значение ограничено или незначимо