

**Таблица чувствительности основных бактериальных возбудителей к антибиотикам производства ООО «АБОЛмед» (in vitro)**

Микроорганизмы		Грам (+) аэробы									Грам (-) аэробы																			Анаэробы			Прочие								
		<i>Streptococcus spp.</i>	<i>S. pneumoniae</i>	<i>S. viridans</i>	<i>E. faecalis</i>	<i>E. faecium</i>	<i>S. aureus MS</i>	<i>S. aureus MR</i>	<i>S. epidermidis</i>	<i>L. monocytogenes</i>	<i>N. meningitidis</i>	<i>N. gonorrhoeae</i>	<i>M. catarrhalis</i>	<i>H. influenzae</i>	<i>E. coli</i>	<i>P. vulgaris</i>	<i>P. mirabilis</i>	<i>Providencia spp.</i>	<i>Morganella spp.</i>	<i>B. cepacia</i>	<i>S. maltophilia</i>	<i>Y. enterocolitica</i>	<i>P. multocida</i>	<i>Shigella spp.</i>	<i>Salmonella spp.</i>	<i>Klebsiella spp.</i>	<i>Enterobacter spp.</i>	<i>Serratia spp.</i>	<i>Citrobacter spp.</i>	<i>Acinetobacter spp.</i>	<i>P. aeruginosa</i>	<i>Legionella spp.</i>	<i>B. fragilis</i>	<i>Peptostreptococcus spp.</i>	<i>Clostridium spp.</i>	<i>C. difficile</i>	<i>Prevotella melaninogenica</i>	<i>Chlamydia spp.</i>	<i>Mycoplasma spp.</i>	<i>B. burgdorferi</i>	<i>Treponema pallidum</i>
Препарат	I	1-40																																							
		<b>НАЦЕФ®</b> (цефазолин)	1-10: Green, 11-13: Yellow, 14-16: Red, 17-18: Green, 19-22: Red, 23-25: Green, 26-28: Red, 29-31: Green, 32-35: Green, 36-40: Red																																						
<b>ЦЕФАМАБОЛ®</b> (цефамандол)	1-10: Green, 11-13: Yellow, 14-16: Red, 17-18: Green, 19-22: Red, 23-25: Green, 26-28: Red, 29-31: Green, 32-35: Green, 36-40: Red																																								
<b>ЦЕФУРАБОЛ®</b> (цефуроксим)	1-10: Green, 11-13: Yellow, 14-16: Red, 17-18: Green, 19-22: Red, 23-25: Green, 26-28: Red, 29-31: Green, 32-35: Green, 36-40: Red																																								
<b>АНАЭРОЦЕФ®</b> (цефокситин)	1-10: Green, 11-13: Yellow, 14-16: Red, 17-18: Green, 19-22: Red, 23-25: Green, 26-28: Red, 29-31: Green, 32-35: Green, 36-40: Red																																								
<b>ЦЕФАБОЛ®</b> (цефотаксим)	1-10: Green, 11-13: Yellow, 14-16: Red, 17-18: Green, 19-22: Red, 23-25: Green, 26-28: Red, 29-31: Green, 32-35: Green, 36-40: Red																																								
<b>ЦЕФТРИАБОЛ®</b> (цефтриаксон)	1-10: Green, 11-13: Yellow, 14-16: Red, 17-18: Green, 19-22: Red, 23-25: Green, 26-28: Red, 29-31: Green, 32-35: Green, 36-40: Red																																								
<b>ЦЕФОПЕРАБОЛ®</b> (цефоперазон)	1-10: Green, 11-13: Yellow, 14-16: Red, 17-18: Green, 19-22: Red, 23-25: Green, 26-28: Red, 29-31: Green, 32-35: Green, 36-40: Red																																								
<b>ВИЦЕФ®</b> (цефтазидим)	1-10: Green, 11-13: Yellow, 14-16: Red, 17-18: Green, 19-22: Red, 23-25: Green, 26-28: Red, 29-31: Green, 32-35: Green, 36-40: Red																																								
<b>СУЛЬПЕРАЦЕФ®</b> (цефоперазон/сульбактам)	1-10: Green, 11-13: Yellow, 14-16: Red, 17-18: Green, 19-22: Red, 23-25: Green, 26-28: Red, 29-31: Green, 32-35: Green, 36-40: Red																																								
<b>МАКСИЦЕФ®</b> (цефепим)	1-10: Green, 11-13: Yellow, 14-16: Red, 17-18: Green, 19-22: Red, 23-25: Green, 26-28: Red, 29-31: Green, 32-35: Green, 36-40: Red																																								
<b>ЛИКЛАВ®</b> (амоксциллин/клавуланат)	1-10: Green, 11-13: Yellow, 14-16: Red, 17-18: Green, 19-22: Red, 23-25: Green, 26-28: Red, 29-31: Green, 32-35: Green, 36-40: Red																																								
<b>МЕРОПЕНАБОЛ®</b> (меропенем)	1-10: Green, 11-13: Yellow, 14-16: Red, 17-18: Green, 19-22: Red, 23-25: Green, 26-28: Red, 29-31: Green, 32-35: Green, 36-40: Red																																								
<b>УРОФОСФАБОЛ®</b> (фосфомицин)	1-10: Green, 11-13: Yellow, 14-16: Red, 17-18: Green, 19-22: Red, 23-25: Green, 26-28: Red, 29-31: Green, 32-35: Green, 36-40: Red																																								

■ – возбудитель чувствителен к препарату (при МПК<sub>50</sub> чувствительны более 60% штаммов)  
■ – возбудитель умеренно чувствителен к препарату (при МПК<sub>50</sub> чувствительны от 30 до 60% штаммов)  
■ – возбудитель нечувствителен к препарату (при МПК<sub>50</sub> чувствительны менее 30% штаммов)

■ – нет определенных (достоверных) клиничко-микробиологических данных об активности  
\* – клиническое значение ограничено или незначимо