

Рекомендуемые режимы терапии с использованием Пефлоксабола®

Нозология	Режим	Продолжительность терапии
Бактериальный менингит, вызванный менингококками или грамотрицательными бактериями	ПЕФЛОКСАБОЛ – 800 мг в/в – первая доза, затем по 400 мг в/в каждые 8-12 ч.	Зависит от возбудителя, в среднем 7-21 день
Инфекции нижних дыхательных путей: пневмония (в т.ч. вызванная грамотрицательными бактериями), обострение хронического бронхита, обострение бронхоэктатической болезни	ПЕФЛОКСАБОЛ – 800 мг в/в – первая доза, затем по 400 мг в/в каждые 12 часов (при тяжелой инфекции: по 400 мг в/в каждые 8 часов)	Зависит от возбудителя, в среднем 7-14 дней; рекомендуется ступенчатая терапия
Вторичный перитонит (в т.ч. послеоперационный перитонит)	ПЕФЛОКСАБОЛ – 800 мг в/в – первая доза, затем по 400 мг в/в каждые 12 часов + МЕТРОНИДАЛ 500 мг каждые 8 часов <i>или</i> клиндамицин 600 мг в/в или в/м каждые 8 ч.; при в/в введении – вводить, соблюдая очередность, или в разные в/в катетеры	7-10 дней
Инфекции желчевыводящих путей	ПЕФЛОКСАБОЛ – 800 мг в/в – первая доза, затем по 400 мг в/в каждые 12 часов + МЕТРОНИДАЛ 500 мг каждые 8 часов или клиндамицин 600 мг в/в или в/м каждые 8 ч.; при в/в введении – вводить, соблюдая очередность, или в разные в/в катетеры	7-10 дней
Инфекции мочевыводящих путей (ИМВП)	ПЕФЛОКСАБОЛ – 800 мг в/в – первая доза, затем по 400 мг в/в каждые 12 часов	Тяжелые и осложненные – 10-14 дней; рекомендуется ступенчатая терапия
Инфекции органов малого таза у женщин	ПЕФЛОКСАБОЛ – 800 мг в/в – первая доза, затем по 400 мг в/в каждые 12 часов + МЕТРОНИДАЛ 500 мг каждые 8 часов или клиндамицин 600 мг в/в или в/м каждые 8 ч.; при в/в введении – вводить, соблюдая очередность, или в разные в/в катетеры	10-14 дней
Инфекции кожи и мягких тканей, в том числе раневая инфекция	ПЕФЛОКСАБОЛ – 800 мг в/в – первая доза, затем по 400 мг в/в каждые 12 часов +/- МЕТРОНИДАЛ 500 мг каждые 8 часов; вводить, соблюдая очередность, или в разные в/в катетеры	7-10 дней; рекомендуется ступенчатая терапия
Инфекции у больных с иммунодефицитом	ПЕФЛОКСАБОЛ – 800 мг в/в – первая доза, затем по 400 мг в/в каждые 8 часов +/- амикацин 5 мг/кг каждые 8 ч или по 7,5 мг/кг каждые 12 ч.	14-21 день
Сепсис	ПЕФЛОКСАБОЛ – 800 мг в/в – первая доза, затем по 400 мг в/в каждые 8-12 часов	14-21 день
Периоперационная антибиотикопрофилактика	ПЕФЛОКСАБОЛ – 400-800 мг в/в +/- МЕТРОНИДАЛ 500 мг, начать инфузию за 60-90 мин. до операции; вводить, соблюдая очередность, или в разные в/в катетеры	