

**Средние дозы некоторых препаратов производства ООО «АБОЛмед»
у новорожденных (дети до 1 мес.)**

Препарат	Путь введения	Разовые дозы и интервалы между введениями				
		Масса тела менее 1,2 кг	Масса тела от 1,2 до 2 кг		Масса тела более 2 кг	
		0-4 дней	0-7 дней	Старше 7 дней	0-7 дней	Старше 7 дней
Цефалоспорины						
Нацеф	В/в, в/м	20 мг/кг каждые 12 часов	20 мг/кг каждые 12 часов	20 мг/кг каждые 12 часов	20 мг/кг каждые 12 часов	20 мг/кг каждые 8 часов
Цефабол	В/в, в/м	50 мг/кг каждые 12 часов	50 мг/кг каждые 12 часов	50 мг/кг каждые 8 часов	50 мг/кг каждые 12 часов	50 мг/кг каждые 8 часов
Вицеф	В/в, в/м	30-50 мг/кг каждые 12 часов	30-50 мг/кг каждые 8 часов	30-50 мг/кг каждые 8 часов	30-50 мг/кг каждые 8 часов	30-50 мг/кг каждые 8 часов
Цефтриабол	В/в, в/м	50 мг/кг каждые 24 часа	50 мг/кг каждые 24 часа	50 мг/кг каждые 24 часа	50 мг/кг каждые 24 часа	50 мг/кг каждые 24 часа
Антибиотики других групп						
Урофосфабол	В/в	100-400 мг/кг/сутки, разделить на 3 внутривенных введения, с интервалом 8 ч.				

**Дозы некоторых антимикробных препаратов ООО «АБОЛмед»
для лечения пневмоний у новорожденных**

Препарат	Путь введения	Разовые дозы и интервалы между введениями				
		Масса тела менее 1,2 кг	Масса тела от 1,2 до 2 кг		Масса тела более 2 кг	
		0-4 дней	0-7 дней	Старше 7 дней	0-7 дней	Старше 7 дней
Цефалоспорины						
Цефабол	В/в, в/м	50 мг/кг каждые 12 часов	50 мг/кг каждые 12 часов	50 мг/кг каждые 8 часов	50 мг/кг каждые 12 часов	50 мг/кг каждые 8 часов
Вицеф	В/в, в/м	30-50 мг/кг каждые 12 часов	30-50 мг/кг каждые 8 часов	30-50 мг/кг каждые 8 часов	30-50 мг/кг каждые 8 часов	30-50 мг/кг каждые 8 часов

**Дозы некоторых антимикробных препаратов ООО «АБОЛмед»
для лечения острого бактериального менингита у детей**

Препарат	Суточные дозы и кратность введения		
	Новорожденные (0-7 дней)	Новорожденные (8-28 дней)	Дети
Цефабол*	100-150 мг/кг/сутки в 2-3 введения	200 мг/кг/сутки, в 3-4 введения	200-300 мг/кг/сутки в 4 введения
Вицеф	60 мг/кг/сутки в 2 введения	90 мг/кг/сутки в 3 введения	125-150 мг/кг/сутки, в 3 введения
Цефтриабол	-	-	100 мг/кг/сутки в 2 введения
Максидеф	-	-	Старше 2 мес. - 150 мг/кг/сутки в 3 введения

* - поскольку у новорожденных детей возбудителями бактериального менингита, помимо стрептококков и энтеробактерий, являются листерии, терапию **Цефаболом** рекомендуется дополнить одновременным назначением ампициллина.